

# VADEMECUM SKUTECZNEGO ZWALCZANIA STONKI

Mospilan<sup>®</sup>  
20 SP



**Monitoring plantacji** należy prowadzić już od momentu pojawienia się części zielonych rośliny.



Pierwsze na plantacji pojawiają się chrząszcze – gdy temperatura gleby osiągnie 15°C, wychodzą z gleby nieregularnie przez okres nawet 2–3 tygodni. Dlatego warto rozpocząć ochronę insektycydową odpowiednio wcześniej – **najlepiej w okresie masowego składania jaj i wylęgania się larw I pokolenia**. Zapobiegnie to namnożeniu się szkodnika.



Jeden zabieg może okazać się nieefektywny. Warto wykonać sekwencję zabiegów, stosując produkty zawierające **różne substancje czynne**.



Zabiegi należy wykonywać **po przekroczeniu progów szkodliwości**. Dla stonki wynoszą one: 10 żółt jaj na 10 roślinach lub 15 larw na roślinie, lub 1–2 chrząszcze na 1 m<sup>2</sup>.



Zabiegi należy wykonywać w **odpowiedniej temperaturze** (w okresach upałów – w godzinach wczesnoporannych).



Należy użyć **odpowiedniej ilości wody, czyli 200–400 litrów** (im większy łan, tym większa ilość wody).



SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.  
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

