

TOPARI Rzepak i burak

Prawidłowe nawożenie dolistne makro- i mikroelementami
zapewnia zoptymalizowane odżywianie roślin.

Uprawa	Zalecenia	
	Dawka	Termin
Rzepak ozimy	2–3 l/ha	Jesienią w fazie 4–6 liści. Wiosną do fazy kwitnienia.
Rzepak jary	2–3 l/ha	Od fazy 4 liści do fazy kwitnienia.
Burak cukrowy	2–3 l/ha	W fazie 4–6 liści. Zaleca się powtórzenie zabiegu po 10–14 dniach.

W razie pytań lub wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Przed użyciem wstrząśnąć!

Mieszanie z innymi produktami:

Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji.

Ze względu na to, że w praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca się wykonanie próby mieszalności na małej ilości produktów przewidzianych do zmieszania. Produkty z zawartością substancji z grupy regulatorów wzrostu powinny w szczególności zostać poddane próbie mieszalności.

Nie mieszać z nawozami zawierającymi fosforany lub siarczany. W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonej powierzchni. Przed sporządzeniem nieznannej mieszanki produktów lub w razie wątpliwości zalecany jest kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu. Ciecz przeznaczoną do oprysku należy nieustannie mieszać i niezwłocznie zużyć! Za działanie łączne stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

Należy przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej.

Ilość wody w zabiegu należy dostosować do opryskiwanej powierzchni w celu dokładnego jej pokrycia przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka spływania.

Zabieg należy wykonać co najmniej 2 godziny przed deszczowaniem lub spodziewanym opadem deszczu.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Numer partii i data ważności są podane na opakowaniu.

UFI Q910-S042-1004-R2QK

Przechowywanie:

Nasze produkty są testowane w zakresie temperatur od -10°C do +45°C i mogą być przechowywane w tych warunkach. Powstające kryształy spowodowane przechowywaniem w chłodzie ulegają rozpuszczeniu w wyższych temperaturach. Zalecamy chronienie produktu przed mrozem i temperaturę produktu powyżej +5°C w czasie użytkowania.


EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Używać tylko w razie potrzeby. Nie przekraczać zalecanej dawki.

Zawartość:

14,8 kg netto
10 litrów



5 901891 283709

